



Prof. **Antonino Di Pietro**  
dermatologo  
a Milano

Risponde il 3 settembre  
dalle 11 alle 13 allo  
02-70300159

**D** In seguito alla puntura di zanzara su un braccio, mi sono venute tante crosticine rossastre che mi danno un forte prurito. Di che cosa potrebbe trattarsi?

**R**ISPONDE L'ESPERTO

Accade spesso che il mantello cutaneo, che ha una funzione isolante e protettiva, non sia più integro per colpa di una fessura o della puntura di una zanzara. Così i batteri che normalmente vivono sulla superficie epidermica (come Stafilococchi e Streptococchi) ne approfittano per penetrare sotto pelle, fino al derma, provocando un'infezione chiamata impetigine.

• All'inizio compaiono delle piccole vescicole piene di pus, molto pruriginose. Grattandosi, l'infezione si espande e la cute diventa molto ammassata, con lesioni a graffio

che lasciano il posto a delle crosticine.

• Come terapia, le consiglio di disinfettare più volte al giorno la pelle con una soluzione cutanea a base di clorammina e di applicare per cinque giorni, due volte al dì, una penna antibiotica a base di aureomicina, clindamicina o gentamicina. Se la zona infetta è molto estesa, è consigliabile associarvi un antibiotico per bocca (esifitricina) per 4 giorni. L'attenzione alla sabbia, al sole e ai bagni in mare possono allungare i tempi di guarigione. E poiché l'impetigine è contagiosa, è bene che usi asciugamani e biancheria personali ed eviti effusioni coi bambini finché non sarà guarita.

Invia le tue domande a [starbene@mondoespressi.it](mailto:starbene@mondoespressi.it)

Selezionato da Starbene: [isplad.org](http://isplad.org)

STARBENE 59